

# AMINO Zn-Mn

## FICHA TÉCNICA



**NATURALEZA:** ORGÁNICO

**TIPO:** USO FOLIAR

**ESTADO FÍSICO:** LÍQUIDO

El fertilizante **Amino Zinc-Manganeso** es un Bio-estimulante de acción directa, con alta concentración de Zinc y Manganeso acomplejados por L- $\alpha$ -Aminoácidos en alta concentración, obtenidos por hidrólisis enzimática de proteínas de alto valor biológico.

El Corrector foliar de **Amino Zinc Manganeso Bloemen** aporta Zinc y Manganeso necesarios para el crecimiento y desarrollo de vegetales, elemento clave en la nutrición mineral de muchos cultivos, en especial en frutales y vid.

El Zinc y Manganeso participan activamente en el metabolismo de la proteínas y actúa en la síntesis como principal precursor del Ácido acético, importante hormona vegetal.

### BENEFICIOS

- Aumenta la emisión radicular a comienzo del ciclo y provoca un importante incremento en la actividad fotosintética.
- Incrementa la actividad metabólica de las proteínas como enzimas y hormonas, como es el caso del Ácido Indol Acético.
- Suministra el Zinc y el Manganeso necesarios contrarrestando deficiencias claves en mucha plantas y principalmente en frutales.
- Contrarresta los síntomas de acortamiento de entrenudos causados por deficiencia de Zinc y Manganeso, muy común en frutales.
- Revierte los efectos de formación foliar aumentando el área foliar y la fotosíntesis, resultando en un aumento de la producción.

### COMPOSICIÓN

- Zinc (Zn): 5%
- Manganeso (Mn): 2 %
- Aminoácidos libres totales: 53 gr/lit
- Nitrógeno total (N): 1% p/p

Densidad: .....1,26 g/ml

pH:.....6,2

Apariencia.....Líquido marrón claro/olor característico.

Presentación:.....Envases plásticos de 20 L

Características:.....No tóxico-No corrosivo-No inflamable-No peligroso.

### DÓSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS L/Ha	MOMENTO Y RECOMENDACIÓN
FRUTALES PERA Y MANZANA	3 A 5 Ajustar según densidad de plantación, variedad y edad del monte frutal.	Aplicar después de la caída de pétalos en 2 a 3 aplicaciones cada 10 a 15 días mientras exista crecimiento de brotes.
CÍTRICOS	2 A 3 Ajustar según densidad de plantación, variedad y edad del monte frutal.	1º aplic. luego de la cosecha, 2º aplic. prearación junto a la aplicación de Boro.
VID	2 A 3 Ajustar según densidad de plantación, variedad y edad del monte frutal.	En crecimiento de brotes. Post cuaje. Estimula el crecimiento.
OLIVO	3	1º aplic. desde brotación hasta prearación, 2º aplic. desde endurecimiento de carozo hasta desarrollo del fruto.
PAPA	2 A 3	Realizar 2 a 3 aplicaciones.
CULTIVOS EN GENERAL	3 A 5	Realizar 2 a 3 aplicaciones o más (a considerar por el asesor).

Estas indicaciones son orientativas, para la exacta determinación de las mismas, recomendamos el asesoramiento de un profesional. Recomendamos aplicaciones oportunas posteriores a situaciones de estrés.

NO pulverizar en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación.

[www.bloemen.com.ar](http://www.bloemen.com.ar)