

CORRECTOR de Mg

BIOBLOEMEN
FICHA TÉCNICA



NATURALEZA: ORGÁNICO

TIPO: USO FOLIAR

ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO

Corrector Mg Bioestimulante de acción directa, con Magnesio de elevada movilidad, acompañado por L- α -Aminoácidos, en alta concentración.

La aplicación del Corrector Mg Biobloemen vía foliar es la forma más rápida y eficiente de aplicar Magnesio, este elemento se manifiesta en deficiencia en varios cultivos y es uno de los constituyentes más importante de la molécula de clorofila y por lo tanto fundamental en la actividad fotosintética de la planta.

BENEFICIOS

- Contribuye a mantener los niveles adecuados de Magnesio, elemento fundamental de la molécula de clorofila, necesaria para la función fotosintética de la planta.
- Revierte el efecto de clorosis característico en las hojas adultas particularmente en ramas con muchas frutas.
- Actúa como promotor en la absorción y transporte de Fósforo.
- Interviene activamente en el aporte, formación y transporte de proteínas, vitaminas, azúcares y ciertas hormonas.
- Revierte las deficiencias de Magnesio en los suelos donde la relación de Potasio/Magnesio es alta, es decir donde se observa elevada saturación con Potasio. En ciertos casos el Calcio en exceso, también puede provocar deficiencias de Magnesio.

COMPOSICIÓN

- Magnesio (Mg): 3,1 % p/p
- Aminoácidos libres totales: 52,2 gr/lit
- Nitrógeno total (N): 1% p/p

Densidad:1,25 kg/lit

pH:.....6,5-7

Solubilidad..... Soluble en todas proporciones.

Presentación:.....Envases plásticos de 20 lts

Características:.....No tóxico-No corrosivo-No inflamable-No peligroso.

DÓSIS Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS L/Ha	MOMENTO Y RECOMENDACIÓN
MANZANA Y PERA	3 A 5	Desde fruto chico, con 3 o más aplicaciones, en intervalos entre 15 a 20 días (se recomienda una aplicación post cosecha para evitar la caída precoz de hojas)
CÍTRICOS	4 A 6	2 a 3 aplicaciones, la 1ª aplic. en primavera con frutos de 5 cm, las restantes aplicaciones en tamaño máximo del fruto, separadas cada 15 días.
VID	3 A 5	3 aplicaciones cada 15 días, desde baya pinta a cosecha para corregir deficiencia y/o previniendo deficiencias desde baya cuajada.
HORTÍCOLA	3 A 6	A partir de los 15 días de la emergencia para verdura de tubérculo o de bulbo y de 6 a 8 hojas para verdura de hoja repetir tratamiento cada 15 días 2 a 3 veces.
OLIVO	3 A 5	1ª aplic. prefloración, 2ª aplic. desde comienzo desarrollo de fruto, 3ª aplic. a los 15 días, 4ª aplic. idem 3ª aplic.
CULTIVOS EN GENERAL	3 A 6	A definir por cultivo, lugar y demás objetivos productivos.

Estas indicaciones son orientativas, para la exacta determinación de las mismas, recomendamos el asesoramiento de un profesional. Recomendamos aplicaciones oportunas posteriores a situaciones de estrés.

NO pulverizar en tiempo muy caluroso o muy seco, ni en horas de insolación.

www.bloemen.com.ar